

Информационное письмо

«Об организации вакцинации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям детскому и взрослому населению в условиях распространения COVID-19»

В связи с информационным письмом главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю.Поповой № 02/5067-2020-23 от 25.03.2020г. «О приостановлении вакцинации в субъектах», согласно которому рекомендовано приостановить в субъектах РФ плановую иммунизацию подлежащего в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением иммунизации в эпидемических очагах) **взрослого** населения, ряд территорий приняли региональные документы, приостанавливающие иммунизацию на период пандемии COVID-19 **не только взрослого населения, но и детского.**

Но плановые прививки детям нельзя останавливать! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий (1-3). **Первостепенная значимость должна уделяться выполнению первичных схем иммунизации в младенческом возрасте** против туберкулеза, гепатита В (являющейся по сути жизнесохраняющей профилактической технологией) преимущественно с использованием комбинированных вакцин в четком соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Особенно важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, полиомиелита, кори, дифтерии, коклюша, эпидемического паротита ~~сезонного гриппа.~~

Следует понимать, что отмена профилактических прививок даже на короткое время **приведет к дополнительному росту** числа восприимчивых лиц и **повышению вероятности возникновения вспышек инфекций**, управляемых средствами специфической профилактики – кори, краснухи, полиомиелита. Наблюдаемый в стране рост заболеваемости коклюшем с высокими показателями заболеваемости и тяжелым течением инфекции у детей до года при отмене профилактических прививок приведет к возникновению **вспышек в учреждениях родовспоможения**. Организация весеннего призыва требует проведения профилактических прививок, регламентированных Национальным календарем профилактических прививок, и призывникам. В связи с природно-климатическими особенностями зимы 2019-2020 года прогнозируется увеличение численности клещей и рост заболеваемости в эндемичных территориях по клещевому энцефалиту. Все это увеличит нагрузку на систему здравоохранения и без того испытывающую большое напряжение в связи с пандемией COVID -19.

В свете выше изложенного и в соответствии с рекомендациями ВОЗ «Руководство по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ» <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020> в целях поддержания популяционного иммунитета на уровне, препятствующем распространению инфекций, в условиях распространения COVID-19 считаем целесообразным:

- **продолжить проведение прививок** в рамках НКПП и КПП по эпидемическим показаниям детскому населению и взрослым из групп риска (приоритетно, прививки против гепатита В и туберкулеза в родильных домах, кори, краснухи, коклюша, дифтерии, пневмококковой инфекции (как детей, так и взрослых из групп риска, что в

условиях распространения COVID-19 имеет особое значение), клещевого энцефалита; особое внимание уделить иммунизации призывников;

- в целях **обеспечения изоляционно-ограничительных мероприятий** (режима ограничения и самоизоляции) для минимизации возможности воздействия COVID-19 организовать в поликлиниках режим работы, исключающий скопление пациентов в холлах и коридорах медицинских организаций, заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на контрольные посещения здоровых людей и иммунизацию;
- **исключить скученность** в залах ожидания, для чего рассмотреть возможность изменения продолжительности приема и ступенчатого сдвига начала приема у разных специалистов, проводящих вакцинацию;
- **организовать при необходимости выездные бригады** для облегчения доступа к иммунизации с обеспечением минимального риска инфицирования (продолжающие функционировать предприятия и организации, закрытые социальные коллективы);
- обеспечить при проведении иммунизации **меры профилактики распространения COVID-19**: использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и социального дистанцирования (находиться на расстоянии не менее 2 метров от других лиц), режима проветривания и кварцевания помещений, проведение влажной уборки с использованием обеззараживающих средств.

Целесообразность проведения иммунизации как одного из приоритетов службы охраны здоровья в течение пандемии COVID-19, продиктована рисками, связанными с управляемыми инфекциями в условиях сформировавшейся вакцинозависимости нашего общества, а также преимуществами вакцинации. Сложившаяся эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации **на текущий момент позволяет сохранить плановую иммунизацию населения** (исключив при этом массовые компании иммунизации) и проводить ее следует настолько долго, насколько это позволяют ответные меры на вспышку COVID-19.

Список литературы:

1. Руководство по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ (по состоянию на 20 марта 2020 г.)
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/433814/Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic-rus.pdf?ua=1
2. Maintaining Childhood Immunizations During COVID-19 Pandemic. Рекомендации CDC
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/index.html>
3. Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic Interim guidance
26 March 2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf